

UNIVERSITY HOSPITAL BRNO
FACULTY OF MEDICINE
MASARYK UNIVERSITY



DEPARTMENT OF **PAEDIATRIC**
ANAESTHESIOLOGY
AND INTENSIVE CARE MEDICINE

Bleskový úvod do anestezie: Evropská dotazníková akce

Jozef Klučka

 **FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO**

**M U N I
M E D**


Rapid-sequence induction

- 1970 – 50 let v klinické praxi
- Thiopental + sukcinylcholin + Sellick ???
- Je to stále pravda?
- Kde jsou EBM data?
- Jaká je klinická praxe?



RSI kontrovezé

- Chybí l
- Kontro
- opioidy
- Publikc
- Data tý



oxygenace,




RSI dotazník

- Cílem bylo zhodnotit aktuální praxi RSI u dospělých versus dětských pacientů
- Příprava a komunikace s ESA – 2 roky :D
- Rozeslán členům European Society of Anaesthesiology – SurveyMonkey™
- Podpora ESA, ČSARIM, Akutně.cz


- 2 obecné dotazy (kvalifikace, místo praxe)
- 11 dospělý pacienti RSI
- 12 dětský pacient RSI
- 5-7 minut



Your anaesthesiology practice is located?



In what situations do You indicate RSI? (multiple choice question)



Potenciálně ohroženo 12,45% pacientů =
200 pacientů !!!

■ Adult ■ Paed



What kind of patient's position do You prefer for Rapid-sequence induction?



Do You use Sellick manoeuvre in RSI?



What kind of induction agent do You use for RSI?



■ Propofol ■ Thiopental/Thiopentone ■ Etomidate ■ Ketamine ■ Benzodiazepine – e.g. midazolam ■ Inhalation induction with sevoflurane



Do You ventilate the patient via face mask before anaesthesia induction (before first intubation attempt)?



Celkem 39

maskou po indukci do anestezie benem RSI!!!

(<12cm H2O)



Děkuji za



**KEEP
CALM
ANESTHESIA
IS
HERE**

ěkuji za

